Mérida, Yucatán a 27 de octubre de 2026

ANÁLISIS DE RETINA: ÁREA MACULAR

NOMBRE DEL PACIENTE: Sra. MARÍA DE LOURDES CHACÓN AMBROSIO
MÉDICO TRATANTE: Dr. CARLOS MARTÍNEZ BOLIO

Se realiza estudio de TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA de DOMINIO ESPECTRAL de la arquitectura macular para su análisis cuantitativo y cualitativo – grosor y estructura –. Se emplea un equipo CIRRUS OCT de ALTA DEFINICIÓN, marca Carl Zeiss Inc. y, **un equipo DRI OCT TRITON** Swept Source Cherence Tomography**.**

OJO DERECHO: Empleando la variante analítica de cubo macular y cinco líneas de alta definición se obtienen imágenes con una fuerza de señal de 10/10. La medida del grosor macular central es de **232 micras**. Las imágenes de alta definición muestran a nivel macular: El vítreo se encuentra claro. En la interfaz vitreo retiniana se observan datos de adhesión vitreo macular extensa con desprendimiento de vitreo posterior parcial, sin tracción. La depresión foveal se encuentra conservada. Hay una estructura normal de las capas internas y medias de retina. En las capas externas de retina se encuentra conservada la línea de elipsoides, así como la unión de segmentos externos e internos de los fotorreceptores. El epitelio pigmentado de retina se encuentra aplicado. La coroides se encuentra de grosor disminuido.

OJO IZQUIERDO: Empleando la variante analítica de cubo macular y cinco líneas de alta definición se obtienen imágenes con una fuerza de señal de 10/10. La medida del grosor macular central es de **230 micras**. Las imágenes de alta definición muestran a nivel macular: El vítreo se encuentra claro. En la interfaz vitreo retiniana se observan datos de adhesión vitreo macular extensa con desprendimiento de vitreo posterior parcial, sin tracción. La depresión foveal se encuentra conservada. Hay una estructura normal de las capas internas y medias de retina. En las capas externas de retina se encuentra conservada la línea de elipsoides, así como la unión de segmentos externos e internos de los fotorreceptores. El epitelio pigmentado de retina se encuentra aplicado. La coroides se encuentra de grosor disminuido.

Angio – OCT:

OJO DER: Calidad de imagen de **10/10.** En la imagen del plexo superficial se aprecia la zona central avascular de aspecto normal. El plexo vascular profundo se encuentra sin alteraciones. Las capas externas de retina, así como la coriocapilaris, se encuentran sin alteraciones.

OJO IZQ: Calidad de imagen de **10/10.** En la imagen del plexo superficial se aprecia la zona central avascular de aspecto normal. El plexo vascular profundo se encuentra sin alteraciones. Las capas externas de retina, así como la coriocapilaris, se encuentran sin alteraciones.

Femenino de 56 años, enviada para estudio de la arquitectura macular y análisis de su espesor.

Los hallazgos tomográficos se encuentran sin anormalidades en ambos ojos. Se recomienda correlacionar los hallazgos con la historia clínica y la exploración física del paciente.

DR. KINGSTON UREÑA WONG **DRA. FABIOLA ORDÓÑEZ AGUILAR** **DR. CARLOS MARTÍNEZ BOLIO**