MEDYTEC®
CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA Y AUDIOLOGÍA

PRISMAVISIÓN®
ÓPTICA AUDÍFONOS

Mérida, Yucatán a 30 julio de 2026

ANALISIS DE RETINA: AREA MACULAR

NOMBRE DEL PACIENTE: Sra. THALIA ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ
MEDICO TRATANTE: Dr. RAMON IGNACIO LOSA CASTILLO

Se realiza estudio de TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA OPTICA de DOMINIO ESPECTRAL de la arquitectura macular para su análisis cuantitativo y cualitativo – grosor y estructura –. Se emplea un equipo CIRRUS OCT de ALTA DEFINICION, marca Carl Zeiss Inc. y, **un equipo DRI OCT TRITON** Swept Source Cherence Tomography**.**

OJO DER: Empleando la variante analítica de cubo macular y cinco líneas de alta definición se obtienen imágenes con una fuerza de señal de 10/10. La medida del grosor macular central es de 209 **micras**. Las imágenes de alta definición muestran a nivel macular interfaz vítreo retiniana sin alteraciones; depresión foveal caracteristica. Capas de retina interna: capas de fibras nerviosas, capas celulares, y plexiforme interna se encuentran organizadas y continuas; Zona mioides, elipsoide, COST (interdigiación de los segmentos externos de foto receptores y epitelio pigmentario) y epitelio pigmentario sin alteraciones.

OJO IZQ : Empleando la variante analítica de cubo macular y cinco líneas de alta definición se obtienen imágenes con una fuerza de señal de 10/10. La medida del grosor macular central es de 212 **micras**. Las imágenes de alta definición muestran a nivel macular interfaz vítreo retiniana sin alteraciones; depresión foveal caracteristica. Capas de retina interna: capas de fibras nerviosas, capas celulares, y plexiforme interna se encuentran organizadas y continuas; Zona mioides, elipsoide, COST (interdigiación de los segmentos externos de foto receptores y epitelio pigmentario) y epitelio pigmentario sin alteraciones.

Angio – OCT :

OJO DER: Plexo vasculares superficiales, profundos y coriocapilar sin alteraciones.

OJO IZQ: Plexo vasculares superficiales, profundos y coriocapilar sin alteraciones.

Paciente del sexo femenino de 34 años enviada para estudio de la arquitectura macular y análisis de su espesor. El análisis muestra:

Impresión diagnóstica:

Los hallazgos tomográficos corresponden a macula sin alteraciones en ambos ojos.

DR. CARLOS MARTÍNEZ BOLIO DR. KINGSTON UREÑA WONG DRA. FABIOLA ORDÓÑEZ AGUILAR

Nota: en nuestras instalaciones y en los procedimientos de diagnóstico aplicamos los protocolos Institucionales vigentes de seguridad e higiene.

Calle 54 No. 364 L entre 33 A Y 35 Centro. Mérida, Yucatán, México C.P. 97000
Citas a los teléfonos: (999) 9268619 / (999) 9268720 / WhatsApp: 999172 2210
www.clinicamedytec.com info@clinicamedytec.com